

Котёнок в новом доме

План на первые дни. Возраст, вес и состояние котёнка определяют обработки, анализы и прививки — их согласуйте с ветеринаром.

01 Спокойное место

Подготовьте тихую комнату: укрытие, лоток, вода, привычный корм. Уберите провода и мелкие предметы, защитите окна. Дайте котёнку освоиться без принуждения.

03 Еда и вода

Если котёнок ест сам, давайте полнорационный корм для котят небольшими порциями несколько раз в день. Чистая вода — всегда. Сохраняйте привычный корм в первые дни. **Коровье молоко не нужно.**

05 Глисты и блохи

При видимых глистах сообщите врачу. **Взвесьте котёнка до выбора препарата.** Средство и дозу подбирают по возрасту и состоянию. **Никогда не используйте собачьи капли:** они могут вызвать судороги и гибель. Проверяйте надпись и знак на **самом тюбике**, даже если коробка для кошек. Ошиблись — срочно звоните ветеринару.

07 Анализы

Врач подберёт их по осмотру и симптомам: кал на паразитов, при необходимости ОАК и адресные ПЦР. Если дома есть кошки, обсудите тесты на FeLV/FIV. Большой ПЦР-пакет не нужен всем котяткам автоматически.

02 Другие животные

Пока держите отдельно, с собственными мисками и лотком. Мойте руки после ухода. Срок знакомства определите после осмотра: при неизвестной истории здоровья изоляция может занять около двух недель или дольше.

04 Ветеринар

Запишитесь на осмотр в ближайшие 1–3 дня; при недомогании — раньше. Попросите оценить возраст, вес, уши, глаза, кожу, живот и общее состояние. Возьмите сведения о прошлых обработках и прививках.

06 Мытьё

После глистогонки купание по расписанию не требуется. Если котёнок испачкался, начните с локального очищения. Полную ванну обсудите с врачом; тщательно согрейте и высушите котёнка. **Проверяйте состав шампуня:** не применяйте средства с перметрином, диазиноном или миноксидилом.

08 Прививки

Попросите график по возрасту и здоровью котёнка. Комплексные прививки обычно начинают примерно с 6–8 недель и повторяют до 16 недель; бешенство — часто с 12 недель. Точный срок и интервалы назовёт врач.

Срочно к ветеринару

Кровь в стуле, повторная рвота, сильная вялость, трудное дыхание, бледные дёсны, гной из глаз или носа. Если маленький котёнок не ест, **не ждите 12 часов**; если не пьёт или быстро слабеет — обращайтесь в неотложную клинику.

Миноксидил (средства для роста волос) смертельно опасен даже в малом количестве. Не допускайте контакта с обработанной кожей и подушкой; при подозрении на контакт сразу звоните ветеринару.